

Sedimentatie metingen op het wad van Ameland, Paesens, Piet Scheve plaat, Engelsmanplaat en Schiermonnikoog

Rapport 2018



Johan Krol

Nes, april 2019

Inhoudsopgave

Samenvatting.....	3
1. Methode.....	4
2. Onderzoeksgebieden.....	7
2.1 Oost-Ameland.....	7
2.2 West-Ameland.....	8
2.3 Piet Scheve plaat.....	9
2.4 Paesens.....	10
2.5 Engelsmanplaat.....	11
2.6 Schiermonnikoog.....	12
2.7. Overzicht alle onderzoeksgebieden.....	13
3. Resultaten.....	14
3.1 Uitwerking per meetstation.....	14
3.2 Resultaten sedimentatiemetingen per onderzoeksgebied.....	14
3.3 Wadsedimentatie in 2018.....	21
3.4 Snelheid wadsedimentatie.....	22
3.5 Wadsedimentatie in relatie tot hoogteligging.....	24
3.5.1 Sedimentatie en hoogteligging van het gebied Oost-Ameland.....	24
3.5.2 Sedimentatie en hoogteligging van het gebied Paesens.....	26
3.6 Wadsedimentatie in relatie tot bodemdaling.....	27
3.6.1 Oost-Ameland sedimentatie en diepe bodemdaling.....	27
3.6.2 Paesens sedimentatie en diepe bodemdaling.....	29
4. Andere sedimentatiemetingen bij Paesens.....	30
4.1 Vergelijking met sedimentatiemetingen op kwelder Paesumerlannen.....	30
4.2 Vergelijking met LIDAR verschilmeting in het onderzoeksgebied.....	32
5. Extreme omstandigheden en sedimentatie.....	33
6. Discussie.....	34
Literatuur.....	36
Bijlage A. Grafieken gemiddelde sedimentatie en SD van alle meetstations onderzoeksgebied Paesens bijgewerkt tm 2018.....	37
Bijlage B. Contourkaart van diepe daling in onderzoeksgebied Paesens.....	39

Samenvatting.

Ten gevolge van gaswinning bij Oost-Ameland (sinds 1986) en Paesens-Moddergat/Lauwersoog (sinds 2007) vindt diepe bodemdaling plaats in het nabijgelegen deel van de Waddenzee. Om vast te kunnen stellen of in dit deel van de Waddenzee verdieping plaats vindt zijn op 6 wadplaten meetstations ingericht (hoofdstuk 1). De gebieden waar gemeten wordt, zijn Oost-Ameland (sinds 2000), West-Ameland (sinds 2006), Piet Scheve plaat (sinds 2014), Paesens-Moddergat (sinds 2003 en uitbreiding in 2007), Engelsmanplaat (sinds 2007) en Schiermonnikoog (sinds 2007). Alleen in de onderzoeksgebieden Paesens en Oost-Ameland vindt daadwerkelijk diepe bodemdaling plaats (figuur 12). Er wordt tweemaandelijks gemeten waarbij de meetstations tijdens laagwater lopend over het wad bezocht worden. Bij ieder meetstation wordt sedimentatie/erosie aan het oppervlak gemeten. Aan de hand van de metingen wordt een gemiddelde sedimentatie/erosie in de tijd per plaatgebied berekend over alle in dat gebied aanwezige meetstations.

In 2018 is op het plaatgebied ten zuiden van Oost-Ameland sprake van 4,5 mm sedimentatie. Ook op het plaatgebied bij West-Ameland (+6,4 mm), Engelsmanplaat (+14,4 mm) en Piet Scheve plaat (+6,3 mm) wordt sedimentatie gemeten. Erosie wordt in 2018 gemeten in de gebieden Paesens (-0,9 mm) en Schiermonnikoog (-10,8 mm) (figuur 24).

Gerekend over de gehele meetperiode die tussen de onderzoeksgebieden varieert van de afgelopen 4 tot 17 jaar is er sprake van sedimentatie in alle 6 onderzochte gebieden. Op Engelsmanplaat is dit vrij weinig met 2,7 mm/j. De overige gebieden sedimenteren meer. Oost-Ameland +5,3 mm/j, Paesens +8,2 mm/j, West-Ameland +5,7 mm/j, Piet Scheve plaat +9,7 mm/j en Schiermonnikoog +5,2 mm/j (figuur 25).

Uit cijfers van de diepe daling van de bodem in het gebied bij Oost-Ameland die voor de periode 1986 tot 2018 beschikbaar zijn (bron: NAM module Ameland_GRIDS_2017) blijkt de diepe daling in een beperkt gebied ten zuiden van het Oerd en de Hon te zorgen voor een netto verlaging van de wadplaat. De diepe daling is hier groter dan de sedimentatie aan het oppervlak (figuur 34).

Uit cijfers van de diepe daling van de bodem in het gebied bij Paesens die voor de periode 2010 tm 2018 beschikbaar zijn in de vorm van een contourkaart (bron: NAM) blijkt dat de daling het hoogst is aan de westzijde van het onderzoeksgebied (P180) en bedraagt daar 25 mm over de gemeten 8 jaar. Aan de oostzijde (P80) is in diezelfde periode geen diepe bodemdaling gemeten. De netto sedimentatie (oppervlak sedimentatie minus diepe daling) in de periode 2007-2018 is alleen bij de westelijke stations P170 (-0,8 mm/j) en P40 (-1,9 mm/j) licht negatief. De overige 16 stations blijven na aftrek van diepe bodemdaling een positieve sedimentatiebalans houden.

Een vergelijking (zie 4.1) van NCA-spijkermetingen met sedimentatie metingen door onderzoeksbureau ARTEMISIA op de overgang van de kwelder Peasumerlannen naar de Waddenzee laat zien dat twee verschillende methodes in dat gebied dezelfde opslibbingstrend en zeer vergelijkbare waarden meten (hoofdstuk 4). In het gebied vlak voor de kwelder Peasumerlannen vindt een forse opslibbing plaats en de bodemhoogte ligt daar inmiddels tussen +60 en +80 cm boven NAP waardoor er goede omstandigheden zijn voor de groei van een uitgebreid stuk pioniervegetatie met Zeekraal.

Een vergelijking (zie 4.2) van NCA-spijkermetingen (dit rapport) met een verschilkaart verkregen uit een LIDAR meting in 2010 en 2017 laat zien dat beide methodes dezelfde trend laten zien en de data zijn ook van dezelfde ordegrootte. Ook in absolute zin komen de sedimentatiegetallen vrij nauwkeurig overeen.

1. Methode.


De sedimentatie aan het wadoppervlak wordt gemeten mbv ondergrondse ankers die 60 tot 90 cm onder het wadoppervlak geplaatst zijn. Aanvankelijk werden hiervoor grote bouwmarkt schroeven gebruikt, later is overgestapt op een nog zwaardere eigenbouw schroef als grondanker. Een meetstation op het wad bestaat uit 4 grondankers (figuur 3) die in een vierkant rond een middelpuntmarkering staan. De afstand van het grondanker tot het middelpunt is ruim 1 meter in de richting van de vier windrichtingen. Ieder meetstation is met handheld GPS ingemeten. De metingen vinden 6 maal per jaar plaats waarbij gestreefd wordt naar het doen van alle metingen in de laatste decade van feb, apr, jun, aug, okt en dec.




Figuur 1. Eigenbouw grondanker waaraan meettouw bevestigd wordt. Rechts de dop aan het uiteinde van de T-grondboor waarmee het anker in de bodem geschroefd wordt (zie figuur 2).



Figuur 2. Grote T-grondboor met dop aan uiteinde waarmee grondanker in de bodem geschroefd wordt. Het meettouw loopt door de grondboor en hieraan wordt later een identificatieblikje en aluminium afleesring bevestigd.



Figuur 3. Bovengrondse aanblik van een meetstation met 4 grondankers. De meettouwjes en afleeslabels zijn op de foto zichtbaar. Voor verduidelijking is een schema over de foto getekend. In het onderzoeksgebied Oost-Ameland is sprake van een duplo meetstation op 10m onderlinge afstand waardoor per meting 8 grondankers opgemeten worden. In alle andere onderzoeksgebieden is steeds sprake van 1 meetstation met 4 grondankers.



Figuur 4. Principeschema van de meetmethode om wadsedimentatie te monitoren. Indien na verloop van tijd een langere afstand tussen meetlabel en wadbodem gemeten wordt is er sprake van erosie. Andersom is er sprake van sedimentatie. Er ontstaat dus een meetreeks waarbij de afwijking van de beginmeting in de tijd gevolgd wordt.




Figuur 5. Meetliniaal met meetvoet. Deze wordt steeds op dezelfde wijze op de bodem gezet waarna de lengte van het meettouw langs de schaal wordt afgelezen. In dit geval 45,1 cm.

2. Onderzoeksgebieden.

2.1 Oost-Ameland.

De eerste metingen zijn in 2000 begonnen in het bodemdalingsgebied Oost-Ameland. Vanaf 2004 zijn hier 16 meetstations ingericht waarbij er steeds sprake is van een duplo. Dat wil zeggen dat op 10 m afstand twee sets van 4 grondankers aangebracht zijn (zie foto 3). Dit werd aanvankelijk gedaan vanwege regelmatige versterking van de meetstations door kokkelvisserij. De kokkelvisserij is inmiddels verboden en alle grondankers worden nu in de metingen opgenomen. In 2012 zijn de stations S160 t/m S180 toegevoegd en hier zijn per station 4 grondankers geplaatst. Het gebied valt binnen de bodemdalingschotel vanwege de gaswinning onder Oost-Ameland. Diepe bodemdaling is sinds 1986 gaande. Dit bedraagt in het onderzoeksgebied tot januari 2017 maximaal 31,9cm (S150) en minimaal 2,5cm (S00). Gemiddeld genomen komt dat neer op een dalingsnelheid van 6,7mm (S150) tot 0,4mm (S00) per jaar. Het meetstation S100 is in 2009 door geulvorming verloren gegaan. Ook het station S90 ligt op een dynamische geulrand en is in 2016 verloren gegaan. Beide stations laten geen plaatsedimentatie zien en zijn in de berekeningen ook weggelaten. Het wantij tussen het kombergingsgebied Borndiep en Pinkegat deelt het onderzoeksgebied in tweeën. Dit ligt tussen S40 (watert af naar westen) en S80 (watert af naar oosten) ter hoogte van de Oerdsloot die als kreek in de kwelder op figuur 6 zichtbaar is.



Figuur 6. Luchtfoto (Google) met meetstations bij Oost-Ameland ingetekend. De geulrandstations S90 en S100 zijn door dynamiek verloren gegaan en worden in deze rapportage niet verwerkt.

Tabel 1. Coördinaten meetstations Oost-Ameland.

LOCATIE	X	Y	NAP cm 2013	Datum Plaatsing
S00	183.915.336	605.684.426	-43,6	30-7-2000
S10	185.751.712	606.260.421	-3	8-8-2000
S20	191.644.819	607.626.886	-9,9	11-8-2000
S30	189.516.132	607.256.622	-3,7	11-8-2000
S40	187.941.418	606.574.201	-16,7	11-8-2000
S50	189.670.958	607.305.138	-5,3	6-3-2001
S60	185.350.031	605.743.287	-52,8	27-3-2002
S70	186.873.300	606.850.877	4,9	27-3-2002
S80	188.863.078	607.400.892	4,7	27-3-2002
S90	189.523.293	606.795.323	-88,1	27-3-2002
S100	191.102.072	607.337.104		27-3-2002
S110	191.027.614	607.886.052	18,4	27-3-2002
S120	186.990.078	606.467.370	-2,5	20-3-2003
S130	191.065.271	607.710.926	-5,2	20-3-2003
S140	189.534,360	607.843,710	20,3	1-3-2004
S150	189.931,860	607.967,500	25,1	1-3-2004
S160	185.456	606.177	-8,7	7-11-2011
S170	187.510	606.750	0,3	20-12-2011
S180	191.233	607.756	-0,3	24-10-2011

2.2 West-Ameland.

Als referentiegebied zonder diepe bodemdaling is op het wad ten zuiden van West-Ameland in 2006 een zestal meetstations ingericht. In 2012 is H70 toegevoegd.



Figuur 7. Luchtfoto (Google) met 7 meetstations bij West-Ameland ingetekend.

Tabel 2. Coördinaten meetstations West-Ameland.

LOCATIE	RD			Datum Plaatsing
	X	Y	NAP cm 2013	Datum
H10	175,248	604,416	49,7	4-09-06
H20	176,617	605,128	6,1	4-09-06
H30	176,601	604,792	7,5	4-09-06
H40	175,811	604,617	44,2	4-09-06
H50	175,997	604,190	6,4	4-09-06
H60	175,397	603,687	6,3	4-09-06
H70	175,534	603,909	22,7	28-2-12

2.3 Piet Scheve plaat.

In 2014 is een nieuw referentiegebied ingericht op de Piet Scheve plaat. Hier is geen diepe daling door gaswinning. De NAP hoogteligging moet nog worden ingemeten.



Figuur 8. Luchtfoto (Google) met 10 meetstations op de Piet Scheve plaat op het wad tussen Holwerd en Nes, ten westen van de vaargeul naar Ameland.

Tabel 3. Coördinaten meetstations Piet Scheve plaat.

	X	Y	Z	Datum plaatsing
PSP 90	180656	601336		8-9-14
PSP 100	180548	601625		8-9-14
PSP 110	180892	602259		8-9-14
PSP 120	181443	602268		8-9-14
PSP 130	181760	601970		8-9-14
PSP 140	181308	601764		8-9-14
PSP 150	181640	601237		8-9-14
PSP 160	181173	601172		8-9-14
PSP 170	180978	601514		8-9-14
PSP 180	181782	601580		19-11-14

2.4 Paesens.

In 2003 is een raai van 6 meetstations (P10 tm P60) uitgezet op het wad ten noorden van Paesens. In 2007 is het gebied uitgebreid en zijn er 12 meetstations toegevoegd waardoor het totaal nu op 18 meetstations komt. Dit gebied sluit aan op het onderzoeksgebied op Engelsmanplaat en ligt binnen de dalingschotel vanwege gaswinning bij Moddergat/Lauwersoog (zie tabel 4).




Figuur 9. Luchtfoto (Google) met 18 meetstations bij Paesens ingetekend.

Tabel 4. Coördinaten meetstations Paesens.

Meetstations Paesens			2-9-2013 NAP cm	Datum Plaatsing	Diepe daling 2010-2018
LOCATIE	X (RD)	Y (RD)			mm/jaar
P10	202334.85	602742.73	74,2	9-9-2003	2,5
P20	202423.84	602898.10	76,5	9-9-2003	2,4
P30	202592.19	603168.55	41,8	9-9-2003	2,3
P40	202707.92	603400.92	8,1	9-9-2003	2,1
P50	202806.22	603619.44	-16,6	9-9-2003	2,0
P60	202904.52	603824.67	-29	9-9-2003	1,9
P70	206110	603031	56,6	26-2-2007	0,3
P80	206357	603300	19,5	26-2-2007	0,0
P90	205538	603392	38,1	26-2-2007	0,6
P100	205080	603702	16	26-2-2007	0,8
P110	204637	603480	27,6	26-2-2007	1,0
P120	204694	602841	80,9	26-2-2007	1,1
P130	203590	603482	10,7	27-2-2007	1,6
P140	203366	602909	60,8	27-2-2007	1,9
P150	202074	603767	-19,4	27-2-2007	2,3
P160	201875	603349	-3,3	27-2-2007	2,5
P170	201624	602902	29,2	27-2-2007	2,8
P180	201153	602819	19,9	27-2-2007	3,1

2.5 Engelsmanplaat.

In 2007 zijn op het zuidelijke deel van Engelsmanplaat zes meetstations uitgezet. Dit gebied sluit aan op het onderzoeksgebied bij Paesens en ligt binnen de uiteindelijk verwachte dalingschotel vanwege gaswinning bij Moddergat/Lauwersoog en Ameland gecombineerd (ongeveer 4 cm in 2040). In 2012 is station E70 toegevoegd. Station E10 ligt op de rand van Engelsmanplaat en dit gebied bleek sinds 2010 enorm dynamisch waarbij het station verloren ging.



Figuur 10. Luchtfoto (Google) met 6 meetstations op Engelsmanplaat ingetekend. In 2012 is station E70 toegevoegd.

Tabel 5. Coördinaten meetstations Engelsmanplaat.

LOKATIE	RD			Datum Plaatsing	DiepeDaling 2007-2012 mm/jaar
	X	Y	3-9-2013 NAP cm		
E10	200.099	607.019		3-03-07	0
E20	199.922	606.518	25,1	3-03-07	0
E30	199.444	606.093	-2,8	3-03-07	0
E40	198.635	605.828	-6,4	3-03-07	0
E50	198.483	606.516	-18,5	3-03-07	0
E60	199.025	606.837	40	3-03-07	0
E70	199.406	606.777	50,9	20-1-12	0

2.6 Schiermonnikoog.

In 2007 zijn 6 meetstations uitgezet ten zuiden van Schiermonnikoog. Drie in het gebied tussen de veerdam en de jachthaven en drie ten westen van de jachthaven. In 2013 is een station C70 toegevoegd. Dit onderzoeksgebied ligt juist op de rand van de voorspelde dalingschotel vanwege gaswinning bij Moddergat/Lauwersoog en dient als referentie voor de gebieden Engelsmanplaat en Paesens. De hoogteligging van de stations is nog niet ingemeten.



Figuur 11. Luchtfoto met 6 meetstations bij Schiermonnikoog ingetekend.

Tabel 6. Coördinaten meetstations Schiermonnikoog.

LOKATIE	RD			Datum Plaatsing	DiepeDaling 2007-2012 mm/jaar
	X	Y	Z		
C10	208.225	609.566		2-03-07	0
C20	207.915	609.379		2-03-07	0
C30	207.764	609.308		2-03-07	0
C40	206.551	608.881		2-03-07	0
C50	206.603	608.722		2-03-07	0
C60	206.233	608.462		2-03-07	0
C70	208.379	609.405		5-04-13	0

2.7. Overzicht alle onderzoeksgebieden.

In het gebied tussen West-Ameland en Schiermonnikoog zijn momenteel in totaal 64 meetstations uitgezet. Hierbij gaat het om 312 grondankers in totaal. Diepe bodemdaling is in 2018 vooral gaande in het gebied Oost-Ameland. Dit al sinds 1986. Er zijn data van de daling van de diepe ondergrond beschikbaar tot januari 2017. In het gebied Paesens/Engelsmanplaat is gaswinning in 2007 gestart en er zijn data van de daling van de diepe ondergrond beschikbaar over de periode 2010-2018.




Figuur 12. Een overzicht van alle onderzoeksgebieden op een luchtfoto (Google) ingetekend. De gele lijn geeft ruwweg de buitengrens van de twee dalingschotels vanwege gaswinning aan. De schotel van Oost-Ameland is daadwerkelijk. De voor de winning bij Paesens/Lauwersoog voorspelde maximale contour is ruwweg getekend. Hierbinnen is tm 2018 alleen in het onderzoeksgebied Paesens sprake van enige daling van de diepe ondergrond.

3. Resultaten.

3.1 Uitwerking per meetstation.


Voor de berekeningen zijn alle beschikbare grondankers meegenomen. In de meeste gevallen betekent dit per meting per meetstation 4 grondankers die gemiddeld worden. Soms is een touwtje met meetlabel (tijdelijk) onvindbaar en vind middeling over de wel beschikbare grondankers plaats. Een voorbeeld van een meetreeks staat in figuur 13. De gemiddelde verandering tussen iedere meting is gecumuleerd ten opzichte van het meetbegin van het station en de standaarddeviatie van iedere meting is ingetekend. Op deze wijze zijn alle meetstations uitgewerkt.




Figuur 13. Meetreeks van meetstation H40 in het onderzoeksgebied West-Ameland.

3.2 Resultaten sedimentatiemetingen per onderzoeksgebied.


Per onderzoeksgebied zijn de gemiddeldes van ieder meetstation samengevoegd in een grafiek. Een eerste voorbeeld hiervan is figuur 14 waar de gemiddelde sedimentatie van de stations P10 tm P60 uit het onderzoeksgebied bij Paesens is weergegeven. Hierin is ook het gemiddelde van deze 6 meetstations uitgezet als indicatie van de sedimentatie van het gebied waarin de meetstations liggen. Een tweede voorbeeld is in figuur 15 weergegeven waar voor het onderzoeksgebied Paesens het gemiddelde van de stations P70 tm P180 staat. Op deze wijze zijn de meetreeksen van alle vijf onderzoeksgebieden uitgewerkt (figuur 14 tm 23).




Figuur 14. Gemiddelde meetlijnen van de meetstations P10 tm P60 in het onderzoeksgebied bij Paesens. Tevens is het gemiddelde (rode lijn) van deze 6 meetlijnen genomen als weergave van de sedimentatie van het gebied waarin de meetstations liggen.




Figuur 15. Gemiddelde meetlijnen van de meetstations P70 tm P180 in het onderzoeksgebied bij Paesens. Tevens is het gemiddelde (rode lijn) van deze 12 meetlijnen genomen als weergave van de sedimentatie van het gebied waarin de meetstations liggen.




Figuur 16. Gemiddelde verschilmeting van de meetstations P10 tm P180 in het onderzoeksgebied bij Paesens..




Figuur 17. Gemiddelde meetlijnen van de meetstations E20 tm E70 in het onderzoeksgebied Engelsmanplaat.




Figuur 18. Gemiddelde verschilmeting van de meetstations E20 tm E70 (zonder E10) in het onderzoeksgebied Engelsmanplaat. E10 is uit de getalsverwerking weggelaten omdat het station vanaf 2009 te maken kreeg met een grote dynamiek. Op de wadplaat van 2007 lag in 2012 een zandbank van een meter hoog waarop sterns met succes broedden! Sinds 2013 is door erosie broeden van vogels op de zandbank onmogelijk en de zandbank is ook westelijk verschoven waardoor E10 ook weer zichtbaar was maar deze is door verdergaande erosie van de plaatrand niet meer vindbaar.




Figuur 19. Gemiddelde meetlijnen van de meetstations C10 tm C70 in het onderzoeksgebied Schiermonnikoog. Tevens is het gemiddelde van deze 7 meetlijnen genomen als weergave van de sedimentatie van het gebied waarin de meetstations liggen.




Figuur 20. Gemiddelde van de gebieden C10 – C30 en C70 (oost) en C40 – C60 (west) en het overall gemiddelde van de meetstations C10 tm C70 in het onderzoeksgebied Schiermonnikoog.



Figuur 21. Gemiddelde meetlijnen van de meetstations S00 tm S80 en S110 tm S180 in het onderzoeksgebied Oost-Ameland. De stations S160 tm S180 starten in 2012. Station S90 en S100 zijn weggelaten. S100 is in 2009 verloren gegaan en S90 in 2006. Beide waren een geulwandstation en niet representatief voor plaatsedimentatie.



Figuur 22. Verschilmeting per keer en cumulatie van de meetstations S00 tm S180 (zonder S90 en S100) in het onderzoeksgebied Oost-Ameland.




Figuur 23. Gemiddelde meetlijnen van de meetstations H10 tm H70 in het onderzoeksgebied West-Ameland.

3.3 Wadsedimentatie in 2018.

Een eerste onderlinge vergelijking van de onderzoeksgebieden op jaarbasis is goed mogelijk. Hiervoor is een vergelijking gemaakt tussen de december waarden. In tabel 7 zijn ook de sedimentatiewaarden op jaarbasis weergegeven uit voorgaande jaren waar dat mogelijk is. In figuur 24 staat de gemiddelde sedimentatie in 2018 van alle onderzoeksgebieden weergegeven. De meeste reeksen zijn nog kort maar over het jaar 2018 kan gezegd worden dat de vier onderzoeksgebieden Oost-Ameland, West-Ameland, Engelsmanplaat en Piet Scheve plaat sedimentatie laten zien. Paesens en Schiermonnikoog laten erosie zien. Voor alle gebieden geldt dat de ter plaatse optredende diepe bodemdaling/zeespiegelstijging nog afgetrokken moet worden van de sedimentatie. De tot nu gepresenteerde data betreft uitsluitend lokale bruto sedimentatie.

Opvallend is de sedimentatie in het onderzoeksgebied Paesens van station P80 (figuur 15). Dit station ligt op de oostpunt van de wadplaat voor de kust van Hoek van de Bant (figuur 9). Het station sedimenteert erg fors. Mogelijk is er sprake van sedimentverplaatsing in oostelijke richting die nog te maken heeft met de afsluiting van het Lauwersmeer maar de werkelijkheid zal ongetwijfeld ingewikkelder in elkaar steken dan wij kunnen bedenken. De indruk bestaat dat sedimentatie bij Paesens iets is wat al langer gaande is dan deze in 2007 begonnen metingen laten zien als er in het veld gekeken wordt. Op het wad voor de kwelderrand bevonden zich in 2007 ook al plantjes Zeekraal die zich nu op het oog samenvoegen tot een zeekraalveld dat zich over bijna drie kilometer lengte uitstrekt langs de bestaande kwelder en dijkvoet tussen Paesens en Hoek van de Bant. Ook op lager gelegen stations verschijnt steeds meer slik en de indruk bestaat dat de plantjes zeekraal zeewaarts en oostwaarts uitbreiden.




Figuur 24. Gemiddelde van alle sedimentatie metingen per onderzoeksgebied in het jaar 2018. Hiervoor is de gemiddelde hoogteligging in december 2018 met december 2017 vergeleken. Getallen in cm.

Tabel 7. Onderlinge vergelijking van de gemiddelde sedimentatie in cm per jaar van de vijf onderzoeksgebieden. Vergeleken is de gemiddelde hoogteligging in december met december van het voorgaande jaar.

	Oost-Ameland	West-Ameland	Piet scheve plaat	Paesens	Engelsmanplaat	Schiermonnikoog
Jaar / Aantal stations	18	7	10	18	6	7
2001	1,29					
2002	0,42					
2003	1,41					
2004	2,26			2,31		
2005	1,73			0,17		
2006	-0,16			1,20		
2007	0,11	1,78		-0,92		
2008	-0,38	1,58		0,33	-0,16	-1,42
2009	1,63	-0,05		0,77	1,19	1,45
2010	-0,11	-0,82		2,49	-1,31	1,62
2011	-1,01	0,43		1,28	-1,21	0,04
2012	-0,91	0,28		0,74	0,47	4,50
2013	0,63	1,45		-0,77	-0,23	-1,52
2014	0,58	-0,04		1,31	-0,54	1,04
2015	0,12	0,31	-0,12	1,47	-0,31	0,58
2016	0,37	0,32	3,01	0,32	0,43	2,38
2017	0,08	-0,78	1,00	1,32	1,23	-0,82
2018	0,44	0,64	0,63	-0,09	1,44	-1,08

3.4 Snelheid wadsedimentatie.

Eigenlijk zegt één jaarcijfer voor wadbodem sedimentatie niet zo heel veel in een gebied waarin voldoende dynamiek heerst om het jaarcijfer voor de diepe bodemdaling door gaswinning vele malen te overtreffen. Diepe bodemdaling door gaswinningen, zeespiegelstijging en wadbodemsedimentatie zijn langzaam verlopende processen die eerder vragen om een langdurige monitoring (decennia) waarbij zo lang mogelijke datareeksen worden verzameld. In deze paragraaf wordt de gemiddelde sedimentatiesnelheid voor de zes verschillende onderzoeksgebieden gepresenteerd (figuur 25) en voor het gebied Paesens is een uitwerking per meetstation gemaakt en op een luchtfoto geprojecteerd (figuur 26). Hierbij moet worden bedacht dat dit cijfer voor de gemiddelde sedimentatiesnelheid betrekking heeft op de volledige meetperiode per gebied of per meetstation tm december 2018 maar dat deze meetperiodes van verschillende lengte zijn (tabel 7). In ieder geval laten ze de sedimentatiesnelheid over de meest recente periode zien. Op Engelsmanplaat is station E10 buiten beschouwing gelaten en bij Oost-Ameland de stations S90 en S100.



Figuur 25. Sedimentatiesnelheid per onderzoeksgebied in mm/jaar. De reeksen waarop het gemiddelde is gebaseerd variëren in lengte van 4 tot 17 jaar (zie tabel 7) maar ze zijn allemaal bijgewerkt tm 2018.



Figuur 26. Sedimentatiesnelheid per meetstation voor het onderzoeksgebied Paesens in de periode 2007-2018 in mm/jaar (gele cijfers). Data bijgewerkt tm 2018.

3.5 Wadsedimentatie in relatie tot hoogteligging.


In 2013 zijn alle stations met DGPS ingemeten, uitgezonderd Schiermonnikoog en Piet Scheve plaat. Hier wordt volstaan met een uitwerking van hoogtemetingen van 2013 van het gebied Oost-Ameland en een actuele uitwerking van de hoogtemetingen van 2013 van het gebied Paesens.

3.5.1 Sedimentatie en hoogteligging van het gebied Oost-Ameland.


Voor het gebied Oost-Ameland wordt gebruik gemaakt van de meest actuele DGPS meting van 2013. Hierin kan een onnauwkeurigheid zitten van ongeveer 2 cm maar desondanks zijn deze data goed bruikbaar om alle meetstations te rangschikken op hoogteligging en te relateren aan de gemeten sedimentatie. In figuur 28 staan de hoogtes gerangschikt en de sedimentatie zoals die tot december 2018 gevorderd was over de gehele meetperiode van ieder meetstation. Hierbij valt op dat het laagstgelegen station S60 het meest erodeert. Dit station ligt op de rand van de wadplaat ten zuiden van de Kooiplaats waar sinds 2010 een trendbreuk zichtbaar is (figuur 21) met erosie tot gevolg. Het station S110 ligt op een plaats waar enige dynamiek van langstrekkende zandlijnen te zien is en dat blijkt ook uit de meetreeks (figuur 29) maar na 2012 neemt de dynamiek sterk af. In zijn algemeenheid blijft het beeld bestaan dat de wadplaten sedimenteren.



Figuur 27. Met DGPS inmeten van station P140 op het wad bij Paesens. Aan de onderkant van de staf is een rooster gemonteerd dat perfect op de wadbodem aansluit en niet wegzakt. De hoogte is ingemeten op de plaats waar het meettouw recht boven het grondanker uit de bodem komt. 2 september 2013. Foto J. Krol.




Figuur 28. Wadsedimentatie ten opzichte van hoogteligging van de meetstations bij Oost-Ameland. Sedimentatiesnelheid in mm per jaar over de totale meetperiode. Meetperiode van de meetstations varieert van 11 tot 17 jaar tussen 2000 en 2018 (zie tabel 7). Meetdatum sedimentatie is in december 2018.



Figuur 29. Meetstation S110 op luchtfoto. Zandgolven veroorzaken lokale dynamiek die na 2011 weer afneemt.

3.5.2 Sedimentatie en hoogteligging van het gebied Paesens.


In september 2013 is de hoogteligging van ieder meetpunt in ieder station bepaald met een DGPS meting. De nauwkeurigheid bedraagt +/- 2 cm. De data staan in tabel 4. De spreiding van de plaathoogte bij de stations ligt tussen +81 cm boven NAP (P120) en -29 cm onder NAP (P60). Gekeken is naar de sedimentatie in relatie tot de hoogteligging van het meetstation (figuur 30). In deze figuur is geen trend te zien. Opvallend is dat het meest westelijke station P180 op +20 cm boven NAP een van de minst sedimenterende stations van de reeks van 18 stations is terwijl het meest oostelijke station P80 ook op +20 cm boven NAP ligt en verweg het meeste sedimenteert van de reeks. De verklaring moet gezocht worden in de lokale geografie van de kust (figuur 9). P180 ligt ten westen van de strekdam bij Paesens en wordt van P80 gescheiden door 2 strekdammen en een geknikte kustlijn die deels bedijkt is. De afstand tussen P180 en P80 bedraagt 5,3 km. Ook de afsluiting van het Lauwersmeer in 1970 heeft mogelijk nog een groter effect op het meest oostelijke station P80.



Figuur 30. Sedimentatie P10 – P180 in relatie tot de hoogteligging in 2013.

Indien lokaal gekeken wordt naar de relatie tussen de hoogteligging en sedimentatie van stations ontstaat er wel een trend (figuur 31). De 4 stations ten westen van de lange strekdam (P150-P180) laten de minste sedimentatie zien bij +20 cm NAP (P180) en hogere en lagere stations sedimenteren meer. Maar het gaat om slechts 4 stations en eigenlijk ontstaat er een beeld van meer sedimentatie verder vanaf de dijk (zie ook figuur 26). De stations P10-P60 die in een rechte raai liggen loodrecht op de dijk ten oosten van de lange strekdam laten de minste opslibbing zien bij +8 cm NAP (P40) en hogere en lagere stations sedimenteren meer. Maar ook hier is er een zekere invloed van de naburige kunstwerken te verwachten. Eigenlijk ontstaat er een beeld van een minimale sedimentatie aan het eind van de strekdam bij P40 en verder het wad op en dichter naar de kust is meer sedimentatie (figuur 26). In hoeverre de hoogteligging of de lokale geografie van de kust domineert in het sedimentatieniveau blijft onduidelijk maar voor deze vrij dicht bij de kust liggende stations lijkt de geografische ligging over de langere termijn bepalender. Het sedimentatiepatroon van alle stations komt wel overeen (figuur 14 en 15, figuur 26), er vindt op alle stations sedimentatie plaats. Het universele beeld ontstaat ook bij een 'extreme event' zoals de ZW-storm op 28 oktober 2013

waar alle stations een forse sedimentatie laten zien die 6 weken later meer dan teniet wordt gedaan bij alle stations door een NW-storm op 6 december 2013 (figuur 16). Bij dergelijk extreme omstandigheden worden alle stations op dezelfde wijze beïnvloed. Bij langdurige ‘rustige’ omstandigheden kan de geografische ligging wel van invloed zijn zoals bijvoorbeeld bij P40 in de buurt van de kop van de strekdam.



Figuur 31. Hoogteligging (2013) en sedimentatie van meetstations bij Paesens in de periode 2007-2018.

3.6 Wadsedimentatie in relatie tot bodemdaling.

Diepe bodemdaling door gaswinning vindt plaats onder de onderzoeksgebieden Oost-Ameland en Paesens. Voor Oost-Ameland zijn data van de diepe daling beschikbaar van 1986 tot januari 2017. Voor ieder sedimentatie station op het wad kan uitgerekend worden wat de diepe daling was op iedere gekozen datum.


Voor het onderzoeksgebied Paesens zijn data van diepe bodemdaling beschikbaar over de periode 2010-2018 op een door de NAM beschikbaar gestelde contourkaart. Hierop kan per sedimentatie station afgelezen worden wat de diepe daling in die periode van 8 jaar bedroeg. Hieruit kan dus ook een lineaire dalingsnelheid worden berekend en worden vergeleken met de in dit onderzoek gemeten snelheden aan het oppervlak.

3.6.1 Oost-Ameland sedimentatie en diepe bodemdaling.


In het gebied Oost-Ameland zijn de meetstations gedaald door diepe daling. In figuur 32 is deze diepe daling per meetstation uitgezet tegenover de sedimentatie en met de rode staaf is steeds het ‘nettoresultaat’ aangegeven. De diepe daling is berekend over de periode 2001-2017 en is verwerkt tot een gemiddelde dalingsnelheid over die periode. De periode is gekozen om overeen te komen met de periode van dit onderzoek waar sedimentatie aan het oppervlak gemeten wordt. Ook de aan het oppervlak gemeten sedimentatie is omgerekend tot een gemiddelde over de gehele meetperiode.

De stations S20 en S60 zijn voorbeelden van plaatsen waar erosie aan het oppervlak gemeten is wat nog wordt versterkt door diepe daling. Hierbij moet goed bedacht worden dat de aan het oppervlak gemeten erosie daadwerkelijk verdwenen sediment betreft en dat de bijdrage van de diepe daling een verlaging van het gehele gebied betreft waardoor het oppervlak lager

ten opzichte van bijvoorbeeld NAP komt te liggen. Dit principe geldt uiteraard voor alle meetstations waarbij sprake is van diepe daling door gaswinning. Bij de stations S110, S50, S130 en S140 zorgt diepe bodemdaling voor een netto daling van het plaatoppervlak waar anders sprake zou zijn van ophoging door sedimentatie. Bij S20 versterkt de diepe daling de minimale erosie behoorlijk. Bij S60 is ook sprake van erosie maar hier speelt diepe bodemdaling nauwelijks een rol. In figuur 33 is op een andere manier grafisch weergegeven hoe de sedimentatie en diepe daling per meetstation samenhangen. Boven de balanslijn is er sprake van ophoging van het plaatniveau (NAP hoogte) en beneden de balanslijn is er sprake van een daling van het plaatniveau (NAP hoogte). In figuur 34 is handmatig geschetst om welk gebied het gaat waarin de stations liggen die in de periode 2000-2018 netto (sedimentatie minus diepe daling) tussen 4,7 en 7,7 mm/jaar dalen. Dit betreft een vrij smalle strook van ongeveer 2 kilometer lengte en beperkte breedte gezien de ligging vlak langs de kust en de sedimentatie bij de omliggende stations. Een ruwe schatting duidt op een sedimenttekort van 3000 m³ /jaar (2000x300x0,005 m) in deze strook om tenminste het maaiveld op gelijke hoogte te houden. Indien alle stations samen worden genomen is er in de periode 2000-2018 sprake van een bruto sedimentatie van 5,3 mm/jaar. Een ruwe schatting duidt op een opslibningsvolume van ongeveer 16.000 m³/jaar (7500x400x0,0053 m) sediment voor het gehele gebied. Door de diepe daling van gemiddeld 3,5 mm/jaar resulteert uiteindelijk een netto ophoging van 1,8 mm/jaar. Ook in eerdere studies (Hoeksema 2004, De Vlas 2005) is geconcludeerd dat de sedimentatie bij Ameland gemiddeld genomen voldoende is om de diepe bodemdaling door gaswinning te compenseren. De nu gemeten netto sedimentatie voldoet hier net aan.



Figuur 32. Gemiddelde jaarlijkse sedimentatie, diepe daling en netto-effect op hoogte wadplaat in mm/jaar per meetstation (zie tabel 1). Diepe daling berekend over feb 2001-jan 2017. De sedimentatie aan het oppervlak is berekend tm 2018.



Figuur 33. Sedimentatie aan het oppervlak uitgezet tegen de diepe daling. Op de balanslijn blijft een station op dezelfde hoogte door gelijke sedimentatie en diepe daling.



Figuur 34. In oranje is handmatig het gebied aangegeven waarin de stations liggen die 4,7 tot 7,7 mm/jaar netto daling laten zien gedurende de periode 2000-2018. De scheiding van het effect van diepe daling in twee effectgebieden ten westen en oosten van de Oerdsloot (wantij) is ook ingetekend.

3.6.2 Paesens sedimentatie en diepe bodemdaling.

In het onderzoeksgebied bij Paesens zijn dalingcijfers van de diepe ondergrond beschikbaar voor de periode 2010 tm 2018 (bijlage B). Deze daling is nog vrij beperkt en bedraagt maximaal 25 mm het station P180. Dat betekent dat de maximale diepe daling plaatsvindt aan de westzijde van het onderzoeksgebied en dat het oostelijke station P80 over dezelfde periode geen diepe daling ondervindt. Figuur 35 laat de netto sedimentatie voor het onderzoeksgebied bij Paesens zien. Hierbij is de diepe bodemdaling van de gemeten sedimentatie afgetrokken. Deze figuur kan het best vergeleken worden met figuur 26, waarin de bruto sedimentatie staat. Hierbij moet goed bedacht worden dat de aan het oppervlak gemeten sedimentatie/erosie daadwerkelijk verplaatst sediment betreft en dat de bijdrage van de diepe daling een verlaging

van het gehele gebied betreft waardoor het oppervlak lager ten opzichte van bijvoorbeeld NAP komt te liggen. Er is niet gecompenseerd voor andere mogelijk van invloed zijnde factoren zoals zeespiegelstijging. Zeespiegelstijging kan beschouwd worden als een motor voor sedimentatie omdat het waddensysteem op verdieping regeert als versterking van een balans van het hydraulisch systeem en dat door sedimentatie repareert. Exacte data daarvan voor de meetstations ontbreken. Eventueel zou zeespiegelstijging in het Paesens gebied in algemene zin over de periode 1988-2018 op 1 mm/jaar gesteld kunnen worden (van Duin, 2019) en dan blijken alleen de stations P170 en P40 licht versterkt te dalen. De overige stations blijven ook dan op dezelfde hoogte of aan de positieve kant van de sedimentatiebalans. Of hydraulische omstandigheden zoals gemiddelde- of maximale waterstanden of de overstromingsduur per jaar tijdens de jaren van deze monitoring gecorreleerd kan worden aan de sedimentatie behoeft nader onderzoek dat buiten deze monitoring valt.



Figuur 35. Netto sedimentatie in millimeters per jaar in 2007-2018. Sedimentatiemeting bijgewerkt tm 2018. Diepe daling berekend over periode 2010 tot 2018. Netto betekent dat de diepe daling van de sedimentatie is afgetrokken. Andere compenserende of versterkende factoren zoals zeespiegelstijging zijn niet verwerkt.

4. Andere sedimentatiemetingen bij Paesens.


4.1 Vergelijking met sedimentatiemetingen op kwelder Paesumerlannen.

Er vinden langjarige sedimentatiemetingen plaats op de kwelder Paesumerlannen. Deze metingen vallen binnen hetzelfde monitoringsonderzoek voor de gaswinning Paesens-Lauwersoog en worden door onderzoeksbureau Artemisia (Den Helder) gedaan (van Duin, 2019). Artemisia gebruikt een methode waarbij de bodem gemeten wordt met een liniaal ten opzichte van een waterpas balk op een gefixeerde hoogte (Sedimentatie Erosie Balk) en dit wordt SEB meting genoemd. Dat is dus een andere methodiek dan die van het NCA waarbij ten opzichte van een ondergronds gefixeerde hoogte gemeten wordt met een liniaal. Op de overgang van de kwelder naar het wad liggen een aantal meetstations van het Natuurcentrum Ameland (NCA) en Artemisia bij elkaar in de buurt en er is een onderlinge vergelijking

gemaakt om te zien of deze stations dezelfde opslibbingstrend aangeven. Omdat de meetreeks van Artemisia vanaf augustus 2007 t/m augustus 2018 loopt zijn ook de metingen van NCA over dezelfde periode berekend (zie tabel 8). De data zijn op een kaartbeeld weergegeven (figuur 36) en ook daaruit blijkt dat de data allemaal dezelfde opslibbingstrend laten zien in een vrijwel steeds volledig vergelijkbare ordegrootte. Alleen station P32 valt iets lager uit maar sedimenteert voldoende om de diepe daling te compenseren (van Duin, 2019). De gemiddelde sedimentatie van 14 mm/j over de periode 2007-2018 past ook duidelijk bij de waarneming dat het kale wad voor de Peazemerlannen de laatste jaren is overgegaan in een met Zeekraal begroeide pionierzone. De hoogteligging van de NCA stations P10, P20, P120 en P140 ligt tussen +60 en +80 cm boven NAP in september 2013 (tabel 4) en daarmee zijn waarschijnlijk de juiste groeiomstandigheden voor Zeekraal bereikt.

Tabel 8. Vergelijking van sedimentatiemetingen van NCA en Artemisia op overgang van kwelder naar Waddenzee. Blauw gearceerd zijn Artemisia data.


	aug 2007- aug 2018
station	mm/j
P10	10
P20	14
P32	6
P140	9
P37	17
P38	16
P120	15
P44	15
P45	23
gem	14



Figuur 36. Kaartbeeld met sedimentatie vergelijking van de meting van NCA en Artemisia. Over periode aug2007- aug2018. Rechts van de gekleurde stip waarmee de locatie van het meetstation wordt aangeduid staat de sedimentatie in mm/jaar.

4.2 Vergelijking met LIDAR verschilmeting in het onderzoeksgebied.


In het kader van de monitoring van mogelijke effecten van de gaswinning op het waddegebied worden ook LIDAR metingen gedaan van het gehele kombergingsgebied van het Pinkegat en de Zoutkamperlaag. Alhoewel er discussie is over de mogelijkheid om hiermee wadhoogteveranderingen nauwkeurig te meten over een korte (enkele jaren) periode (Wang, 2010) is in deze paragraaf een vergelijking gemaakt tussen LIDAR data en NCA spijkermetingen. Wang (2010) geeft aan dat, gezien een meetfout van ongeveer 5 cm, het pas mogelijk is om een trend in hoogteverandering te bepalen met LIDAR na 3 of 4 meetsessies in samenhang met lodingscycli van Rijkswaterstaat die per stuk 6 jaar beslaan. Aanbevolen wordt om op hogere wadplaten de LIDAR metingen te combineren met andere hoogtemetingen zoals waterpassingen. Voor het gebied waar de NCA sedimentatie stations P10 tm P180 liggen is een LIDAR verschilkaart opgevraagd bij de NAM (H. Piening). Voor de periode 2010-2017 is dit mogelijk door een LIDAR meting in maart 2010 en mei 2017. Op deze verschilkaart zijn de cijfers voor sedimentatie met de NCA-spijkermetingen over dezelfde periode (feb 2010-mei 2017) geplaatst (figuur 37). Hieruit blijkt dat zowel de trend als de ordergrootte van de vergelijking tussen deze twee methodes klopt. Zelfs een nadere beschouwing van de absolute cijfers laat zien dat dit op de meeste NCA-stations vrijwel klopt. Alleen station P100 laat een hogere NCA meetwaarde zien dan de kleur op de kaart. Opvallend is de forse sedimentatie aan de oostzijde van de kaart in het gebied waar het NCA-meetstation P80 ligt. Dit is ongetwijfeld nog steeds een onderdeel van de grootschaliger dynamiek van het hele Zoutkamperlaag systeem wat waarschijnlijk nog steeds in reactie is op de afsluiting van de Lauwerszee in 1969.



Figuur 37. Verschilkaart met LIDAR gemeten tussen 2010 en 2017. De locatie van de NCA meetstations P10 tm P180 en de bijbehorende sedimentatie (zwarte getallen in cm) is hierop geplot. Netto betekent dat de diepe daling door gaswinning van de meetdata is afgetrokken.

5. Extreme omstandigheden en sedimentatie.

De hoogteligging en sedimentatie van wadplaten zal overwegend bepaald worden door de invloed van de jaarlijkse 706 overstromingen. Dit dagelijkse spel tussen de zwaartekracht die op slib- en zanddeeltjes wordt uitgeoefend en stroming door getijwerking en golfwerking door wind die de deeltjes over de bodem wil verplaatsen of weer in de waterkolom op wil nemen bepaalt overwegend de bodemhoogte en bodemsamenstelling. Maar enkele van die 706 overstromingen vallen ver buiten de normale dagelijkse waarden en dat wordt veroorzaakt door extreme windomstandigheden (storm). Eind 2013, op 28 oktober en 5-6 december vonden twee stormen plaats met opmerkelijke gevolgen voor met name het onderzoeksgebied bij Paesens. De storm van 28 oktober had overwegend een ZW richting en was vrij kort maar kende extreme windsnelheden¹. Door de ZW-richting vond er weinig stuwing van de waterstand plaats (figuur 34) en lag het gebied bij Paesens min of meer ‘in de luwte’. In deze ‘luwte’ heeft een forse afzetting van slib plaatsgevonden. Tijdens de sedimentatiemeting van 31 oktober (3 dagen na de storm) werd dit niet alleen gemeten maar was dit ook duidelijk zichtbaar en voelbaar tijdens het lopen in het gebied. Op bijna alle stations werd een dikke laag zeer ‘dunne’ blubber (fluid mud) aangetroffen met een consistentie die een forse spetterpartij opleverde indien met een voet op de bodem werd gestampt. Op 2 september werd een gemiddelde sedimentatie van 7,83 cm (P10-P180) gemeten. Op 30 oktober steeg dat tot gemiddeld 10,65 cm (P10-P180). Een gemiddelde sedimentatie van +2,82 cm door de storm van 28 oktober.




Figuur 38. Het verloop van de waterstand bij het RWS meetstation Lauwersoog tijdens de stormen van 28 oktober en 5-6 december in 2013.

Ruim 5 weken later, op 5-6 december 2013 vond er een langdurige noordwesterstorm plaats in combinatie met springtij en dit leidde tot een stormvloed met zeer hoge waterstanden (figuur 34). Sterke noordwesterstormen, die lang duren, hebben duidelijk effect op de waterstanden in de Waddenzee. Bij een NW-wind is er ook veel golfwerking te verwachten op de kust van Paesens. De twee stormtijden hebben er in dit geval voor gezorgd dat het slib

¹ http://www.knmi.nl/cms/content/116311/weeralarm_voor_zware_herfststorm (3-3-2014)

dat er lag compleet is weggevaagd. Tijdens de meting op 12 december was nergens meer de laag blubber van de vorige meting te vinden. Uit de metingen bleek dat de sedimentatie gemiddeld (P10-P180) daalde van 10,65 cm naar 7,24 cm. Een gemiddelde erosie van 3,41 cm over 18 meetstations door deze storm.

In de andere onderzoeksgebieden werd niet een dergelijk sterk effect gevonden. Bij Oost-Ameland en West-Ameland vond juist erosie plaats door de ZW-storm van oktober en sedimentatie door de NW-storm van december. Dit past bij de ligging van de gebieden ten zuiden van Ameland. Bij Schiermonnikoog was dit beeld niet aanwezig. Op Engelsmanplaat zorgde de storm van oktober voor forse erosie wat na de storm van december weer enigszins gecompenseerd werd. Engelsmanplaat ligt erg geëxposeerd voor ZW-wind.



Figuur 39. Sedimentatie in 2013 van de stations P10 tm P180 in het onderzoeksgebied bij Paesens, beginnend met de sedimentatie die vanaf 2007 al was gerealiseerd. Het effect van sterke sedimentatie op 28 oktober 2013 en sterke erosie na de storm van 6 december 2013 is op alle stations zichtbaar.

6. Discussie.

Teneinde vast te kunnen stellen of er een verdieping plaats vindt in het deel van de Waddenzee dat binnen het dalingsgebied van de gaswinning valt, zijn meetstations op wadplaten ingericht. In de onderzoeksopzet is gekozen voor een praktische en pragmatische methodiek. Hierbij is een inschatting gemaakt van het aantal benodigde meetstations per plaatgebied op basis van de grootte en terreineigenschappen (vlakheid) van het gebied en de logistieke inspanning (dikte sliklaag en hoogteligging) om zesmaal per jaar te kunnen meten. De gekozen methode is vooral geschikt voor een weinig dynamische gebied als een vrij vlakke droogvallende plaat. In erg dynamische gebieden als geulranden en in het sublittoraal gaan de meetstations vrij snel verloren of worden onvindbaar omdat ze door een dikke laag sediment bedekt worden. De meetstations zijn zo gekozen dat ze verspreid over het hele plaatgebied voor komen en in een vlak gebied liggen waardoor ze representatief zijn voor een relatief groot gebied. Een aantal meetstations is met opzet in de buurt van een geul,

mosselbank of kwelderrand gelegd om een indruk te krijgen van lokale sedimentatie in een meer dynamische omgeving. Overigens wordt tijdens iedere meting de omgeving van het meetstation op het oog beoordeeld om te zien of het station nog voldoet aan de eisen toen het ingericht is. Daaruit is gebleken dat het merendeel van de meetstations ook na jaren nog steeds representatief is voor de directe omgeving en daarmee de sedimentatie op de plaat. In deze uitwerking zijn van de 66 stations slechts 3 buiten beschouwing gelaten. Dat betreft twee geulstations op Oost-Ameland (S90 en S100) en één station op Engelsmanplaat (E10) dat onder een nieuwe zandrug verdween. In 2007 was hier nog een vrij vlakke plaatrand...in 2012 een zandbank van ongeveer een meter hoog waarop sterns jongen grootbrachten! In een enkel geval spelen er dynamische processen die een onrustiger beeld geven maar deze stations zijn wel in het plaatgemiddelde opgenomen. Soms is de dynamiek ook tijdelijk, zoals bij station S00 bij Oost-Ameland en P60 bij Paesens waar in de loop van de tijd de opkomst en ondergang van een mosselbank werd gemeten. S00 laat in 2015 een forse sedimentatie zien die veroorzaakt is door het ontstaan van een rif van zandkokerwormen (*Pygospio elegans*). Het belang van deze metingen moet gezien worden in een eenvoudige en kosten efficiënte manier om op een nauwkeurige schaal (mm niveau) met een vrij hoge frequentie (zesmaal per jaar) sedimentatie op wadplaten te kunnen volgen. Hierbij wordt een goede indruk gekregen van de sedimentatie in de tijd waarbij vooral duidelijk wordt wat lokaal de natuurlijke variatie is zowel op de korte als op de lange termijn. Naarmate de meetreeksen zich uitstrekken over een langere periode winnen ze aan kracht. Pas na meer meetjaren is het mogelijk om langzame processen als diepe bodemdaling door gaswinning en zeespiegelstijging door klimaatverandering te onderscheiden van natuurlijke variatie op kortere tijdschalen. Daarmee wordt het mogelijk om deze metingen te gebruiken om het effect van events (zoals de stormen) te onderscheiden van gestage effecten als gevolg van bodemdaling door gaswinning waardoor het 'Hand aan de kraan' principe beter toegepast kan worden.

Literatuur:

Van Duin, W.E., 2019. Kweldermonitoring in de Peazemerlannen en het referentiegebied West-Groningen: Evaluatierapport 2007-2018. *Artemisia*-rapport 2019-02, *Artemisia*-kwelderonderzoek, Den Helder.

Hoeksema H.J., e.a.. RIKZ. Bodemdalingstudie Waddenzee 2004. Rapport RIKZ/2004.025.

Krol J., 2018. Evaluatierapport Wadsedimentatiemetingen Ameland, Engelsmanplaat, Paesens en Schiermonnikoog 2007-2017. Natuurcentrum Ameland, Nes.

Vlas J de, e.a.. Begeleidingscommissie Monitoring Bodemdaling Ameland, 2011. Monitoring van effecten van bodemdaling op Ameland-Oost. Evaluatie na 23 jaar gaswinning. Assen. 2011.

Wang, Z.B., Cronin, K., van Ormondt, M.. Analyse Lidar data voor het Friesche Zeegat. 2010. Deltares project 1202285-000.

Adres auteur:


Natuurcentrum Ameland


Johan Krol
Postbox 60
NL 9163ZM Nes Ameland
The Netherlands

mail natuurcentrum.jkrol@planet.nl
phone +31 (0)519542737
fax +31 (0)519542136
mobile +31 (0)651932645

Bijlage A. Grafieken gemiddelde sedimentatie en SD van alle meetstations onderzoeksgebied Paesens bijgewerkt tm 2018.

Op Y-as sedimentatie in cm.





Bijlage B. Contourkaart van diepe daling in onderzoeksgebied Paesens.

Kaart met ligging van de meetstations P10 tm P180 en de contouren van de diepe daling (mm) over de periode 2010-2018. Bron: NAM.

